

راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین بستری هیستروسکوپی :

❖ آمادگی های چند روز قبل از عمل

- ✓ بهتر است برای جلوگیری از رشد بیش از حد دیواره رحم و دید بهتر داخل رحم، بیمار از روز پنجم قاعدگی شروع به مصرف قرص جلوگیری از بارداری HD با نظر پزشک کنید و یا آمپول های مخصوصی تزریق کنید و 2 الی 3 روز بعد از پاکی جهت انجام عمل هیستروسکوپی مراجعه کنید.
- ✓ زمان عمل هیستروسکوپی طوری تنظیم میشود که در دوران قاعدگی نباشد.
- ✓ عفونت زنان قبل از اقدام به عمل باید درمان شود.
- ✓ پماد و کرم های داخلی، 24 ساعت قبل از عمل استعمال نشود.
- ✓ برای کمک به آرامش ممکن است پیش از عمل به شما دارو آرامبخش داده شود.
- ✓ آزمایش های قبل از عمل، بسته به نظر پزشک معالج انجام میشود.
- ✓ از مصرف سیگار و دخانیات در چند ماه قبل و بعد از عمل جراحی اجتناب کنید.
- ✓ در صورتی که بیماری خاصی دارید و تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید، زیرا ممکن است نیاز باشد داروهای شما قطع و داروهای جدید جایگزین شود. در این نوع عمل جراحی مصرف آسپیرین و وارفارین باید قبل از عمل قطع شود.
- ✓ اگر باردار هستید و یا احتمال بارداری را در خودتان می دهید به پزشک اطلاع دهید.

❖ اقدامات قبل از انجام هیستروسکوپی

- ✓ قبل از رفتن به اتاق عمل به شما سرم وصل میشود.
- ✓ بعد از نیمه شب و صبح قبل از عمل، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید. حتی چای، قهوه و آب هم ننوشید.
- ✓ قبل از انتقال به اتاق عمل، مثانه (ادرار) را تخلیه نمایید.
- ✓ موهای موضع عمل، قبل از عمل باید تراشیده شود.
- ✓ قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آلات، اجسام فلزی، گیره سر، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.
- ✓ کلیه لباس ها (لباس زیر، جوراب و ...) را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید.
- ✓ در صورت داشتن سابقه بیماری، سابقه حساسیت (دارویی، غذایی) پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید.
- ✓ عمل شما تحت بیهوشی عمومی یا موضعی انجام میشود.

❖ رژیم غذایی

- ✓ بعد از عمل جراحی و پس از هوشیار شدن و با نظر پزشک و همچنین در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعات شروع کنید.
- ✓ در صورتی که حالت تهوع و استفراغ داشتید از خوردن و آشامیدن خودداری نمایید.

❖ فعالیت

- ✓ در بستر انگستان و مچ پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیری شود.
- ✓ در صورت اجازه پزشک برای خروج از تخت ابتدا نشسته و سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن سرگیجه با کمک همراه خود و یا پرستار از تخت خارج شوید.
- ✓ سعی کنید هر چه سریعتر از بستر خارج شده و فعالیت نمایید تا از ایجاد لخته جلوگیری شود.

❖ مراقبت

- ✓ در صورت داشتن درد، به پرستار اطلاع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد.
- ✓ در صورت خونریزی از محل عمل جراحی و خیس شدن پانسمان به پرستاران بخش اطلاع دهید.
- ✓ از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به خود خودداری کنید.
- ✓ ممکن است دردی در ناحیه نای احساس کنید یا خشونت صدا داشته باشید. این امر به دلیل جایگذاری لوله درون نای است.
- ✓ داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار به شما داده خواهد شد.
- ✓ اگر سوند ادراری فولی در رحم گذاشته شده است، پس از چند روز برداشته میشود.

راهنمای پرستاری جهت آموزش به بیمار، حین ترخیص

❖ وجود همراه در کنار بیمار تا 24 ساعت اول عمل الزامی است.

❖ رژیم غذایی و تغذیه

- ✓ برای تسریع التیام بافت نرم و استخوان، رژیم غذایی پرپروتئین و پرکالری استفاده کنید.
- ✓ جهت پیشگیری از یبوست از رژیم پرفیبر (میوه ها و سبزیجات) حاوی سیبوس و مایعات فراوان استفاده کنید.
- ✓ بهتر است به مدت 48 ساعت از نوشیدن نوشابه های گازدار خودداری کنید.
- ✓ صرف سبزیجات و مرکبات و آبمیوه های تازه حاوی ویتامین ث، میتواند به بهبود سریعتر زخم کمک کند.

❖ فعالیت

- ✓ در روز جراحی و 48 ساعت پس از جراحی هیستروسکوپی، به هیچ عنوان رانندگی نکنید.
- ✓ به مدت یک هفته از ورزش کردن و بلند کردن اجسام سنگینتر از ۱۰ کیلوگرم اجتناب کنید.
- ✓ میتوانید در عرض 3 یا 2 روز پس از عمل فعالیتهای عادی خود را از سر بگیرید.

❖ مراقبت پس از هیستروسکوپی

- ✓ در دو روز اول پس از جراحی، داروهای مسکن نیز برای شما تجویز میشود. از طرفی ممکن است به علت استفاده از دی اکسید کربن حین عمل برای باز کردن شکم، در ناحیه شانه ها و قفسه سینه درد داشته باشید. این درد طی چند روز خود به خود ناپدید خواهد شد.
- ✓ ممکن است به علت استفاده از لوله راه هوایی در ناحیه نای و در طول بیهوشی، گلو درد داشته باشید. مصرف آبنبات و یا قرصهای گلو میتواند به کاهش درد کمک کند.
- ✓ فعالیت جنسی را میتوانید پس از یک هفته و یا بسته به نظر و توصیه پزشک خود شروع نمایید.
- ✓ پس از اتمام هیستروسکوپی تا چند روز دردهای شکمی مشابه دردهای دوران قاعدگی و لکه بینی را تجربه خواهید کرد این موارد طبیعی است ولی اگر خونریزی واضح و زیاد مشاهده کردید به پزشک معالج مراجعه نمایید.
- ✓ از مصرف الکل و دخانیات خودداری نمایید.
- ✓ پس از آماده شدن جواب آزمایش پاتولوژی به پزشک معالج مراجعه نمایید.
- ✓ بطور منظم داروهای آنتی بیوتیک جهت جلوگیری از ایجاد عفونت مصرف کنید.
- ✓ ممکن است پس از جراحی برای تحریک ترمیم آندومتر داروهای هورمونی مانند استروژن و پروژسترون تجویز شوند. توجه داشته باشید که مصرف این داروها از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند و به هیچ وجه مصرف این داروها را خود سرانه قطع نکنید یا تغییر ندهید.
- ✓ توجه داشته باشید که ممکن است قاعدگی بعد از هیستروسکوپی سنگین تر و طولانی تر از معمول شود و چند قاعدگی بعد (تا چندین ماه)، نظم چندان نداشته باشد.
- ✓ پس از انجام هرگونه هیستروسکوپی که اتساع دهانه رحم را در پی داشته، حداقل تا 2 هفته از کار گذاشتن هر ماده یا دارویی داخل واژن پرهیز کنید تا خطر بروز عفونت کم شود.

❖ زمان مراجعه بعدی

- ✓ در در فواصل منظم و مشخص شده توسط پزشک جهت ادامه درمان به پزشک مراجعه نمایید. (جواب پاتولوژی پیگیری گردد و با جواب پاتولوژی به مطب پزشک مراجعه شود).

✓ در صورت هر گونه تاخیر در بهبودی نزد پزشک معالج خود بروید.

✓ در صورت مشاهده علائم زیر به پزشک معالج یا بیمارستان مراجعه نمایید:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| * تب بیش از 38 درجه سانتی گراد | * درد شدید شکمی | * ورم شدید کل بدن |
| * ترشحات یا خونریزی شدید واژینال | * مشکل در دفع ادرار و تنگی نفس | |